Cáncer Cervical: Lo que debe saber

Every Woman Matters



Nebraska Office of Women's Health

Cerca de 150,000 mujeres son diagnosticadas anualmente con cáncer cervical, y aproximadamente 5,000 mujeres pierden la vida cada año en los Estados Unidos.

Usualmente los cambios del precáncer en la cervix no son dolorosos. De hecho, estos generalemente no presentan síntomas y no son detectados a menos que la paciente se lleve a cabo una prueba del Pap o un examen de la pelvis.

Detección del Cáncer Cervical:

El cáncer cervical puede ser prevenido la mayoría de las veces, si es detectado y tratado a tiempo. La mejor manera de detectarlo es por medio de una prueba del Pap. Este procedimiento es muy simple, en el cual el doctor tomará una muestra de células de la apertura de la cervix y las analizará. Algunas mujeres sienten incomodidad durante la prueba, pero generalmente esta prueba no es dolorosa.

Los resultados del Pap mostrarán células normales o anormales. Si las células son normales, es muy probable que le pidan que regrese por otra prueba entre uno y tres años.

Si las células son anormales, el doctor le pedirá que regrese para realizarle una colposcopía y una biópsia. Una colposcopía es una prueba de la cervix, la cual implica un instrumento con una lámpara y una lupa. Los resultados de estaa prueba le indicarán al doctor si usted tiene células anormales en su cervix.

Si el resultado de la biópsia muestra células normales, el tratamiento no será necesario, y usted deberá de hablar con el doctor para determinar cuando deberá de hacerse otra prueba del Pap. Si la biópsia muestra células anormales, tratamiento será necesario, y usted deberá de platicar con su doctor acerca de las opciones de tratamiento disponibles.

La utilización de la prueba del Pap para el chequeo de muejres es una estratégia importante que puede prevenir, la mayoría de la veces, el desarrollo de cáncer cervical al descubrir lesiones en una etapa temprana, cuando éstas pueden ser removidas antes de que se conviertan en cáncer.

Síntomas del Cáncer Cervical:

- En su etapa temprana, el cáncer cervial no muestra síntomas.
- Sangrado irregular
- Sangraddo o dolor durante el contacto sexual
- Descargas vaginales

Por favor lea al reverso

Factores de Riesgo

- Fumar Cigarillos
- Infección del Papilomavirus Humano (HPV)
- No utilizar condones apropiadamente o para nada
- Práctica sexual a temprana edad o con muchas parejas
- Práctica sexual con una pareja que ha tenido relaciones sexuales con muchas parejas
- Historial de enfermedades transmitidas sexualmente (STDs)
- Tener un sistema inmunológico deficiente

Hechos acerca de Cambios del Cáncer o Precáncer de la Cervix:

- El cáncer cervical es un tipo común de cáncer en mujeres.
- Es una enfermedad en la cual células de cáncer (maligno) son descubiertas en los tejídos de la cervix.
- El cáncer de la cervix usualmente crece lentamente durante un periódo de tiempo.
- El cambio de estar normal a tener precáncer o cáncer es normalmente gradual.
- Antes de encontrar las células cancerígenas en la cervix, los tejidos de la cervix atraviesan cambios en los cuales las células que no son normales comienzan a aparecer (esto se conoce como displasia).
- Posteriormente, las células comienzan a crecer y a propagarse mas profundamente en la cervix y en áreas cercanas.
- Existen dos tipos principales de cáncer cervical: 1) Células squamous carcinógenas (al rededor de 85-90% de todos los cánceres de la cervix y,
- 2) adenocarcinomas (el 10-15% de los cánceres cervicales) los cuales se desarrollan en las células de la glándula dedicada a la producción de mucosa en el interior de la cervix.

Recursos Adicionales:

Instituto Nacional del Cáncer	www.nci.nih.gov
Centro de Control y Prevención de Enfermedades	www.cdc.gov/cancer
Coalición Nacionaal del Cáncer Cervical	www.ncc-online.org

Para mayor información:

Oficina de la Salud de la Mujer de Nebraska
301 Centennial Mall South, P.O. Box 94817
Lincoln, NE 68509-4817
Telefono: 1-800-532-2227 TDD: 1-800-833-7352 Fax: 402-471-0913
www.hhss.ne.gov/womenshealth